

Sjukdomsfall av tuberkulos - TBC på förskolan Regnbågen i Tallkrogen

Detta informationsblad är framtaget med anledning av sjukdomsfall av tuberkulos- TBC. Här berättar vi om det som hänt och om hur vi arbetar tills vi kan utesluta att någon blivit smittad. Vi har med några frågor och svar om sjukdomen samt var du kan hitta mer information. Du får också information om vart du kan vända dig för frågor och provtagning med mera.

Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien *Mycobacterium Tuberculosis*. Tuberkulos smittar via aerosol – "vattendroppsmoln" – som bär tuberkelbakterierna och som man andas in. Tuberkulos botas av läkemedelsbehandling.

I Sverige insjuknar årligen ca 500 personer i tuberkulos vilket motsvarar runt fem per 100 000 invånare. Detta är bland de lägsta siffrorna i världen. Under senare år har tuberkulos på nytt börjat spridas inom landet, bland annat beroende på att vi lever i en global värld.

Eftersom det inte finns någon kvarvarande smittkälla på förskolan kommer den att hålla öppet som vanligt. Sjukdomen smittar endast när symtom visas och från vuxen till barn och mellan vuxna. Den smittar inte mellan barn och inte heller genom leksaker eller kläder.

Ulla Thorslund

Stadsdelsdirektör

Farsta stadsdelsförvaltning

Händelseförlopp

Sent på eftermiddagen, fredag den 14 mars, fick stadsdelsförvaltningen information om att en av de anställda på förskolan Regnbågen hade insjuknat i infektionssjukdomen tuberkulos, TBC. Informationen kom från smittskyddsenheten vid Stockholms läns landsting, som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

På måndag morgon, den 17 mars, fick personal och föräldrar/vårdnadshavare kallelser till möten som hölls samma dag. Med på dessa möten fanns läkare från smittskyddsenheten och Barnens sjukhus Karolinska – Huddinge. De kunde svara på frågor och ge information om hur sjukdomen smittar, symtom, provtagning och behandling.

Tisdagen den 18 mars påbörjades provtagningen. Bland de barn som undersökts har inget fall av aktiv tuberkulos hittills konstaterats. Provtagning av övriga barn på förskolan sker den 25 mars och provsvar kommer inom en veckas tid. Provtagningarna upprepas sedan i början av maj. I mitten av maj 2008 har samtliga barn och vuxna på förskolan genomgått testerna och fått provsvar.

Information har lagts ut på stadsdelsförvaltningens webbplats och intranät. Där samlas information som uppdateras efter hand. Fler frågor och svar finns samlade samt riktlinjer som gäller för verksamheter inom Stockholms stad vid misstanke om TBC- och MRSA smitta.



FARSTA
STADSDELSFÖRVALTNING

Jag har en son som jag vill testa för tbc vart ska jag vända mig?

Det finns ingen anledning att testa om man inte haft direkt kontakt med någon som är smittad. Ifall annat barn skulle vara smittat kan det inte föra smittan vidare.

Hur vet man att man har tbc?

Det finns ett hudtest (tuberkulintest) som reagerar om en person blivit infekterad (smittad). De flesta som infekteras blir aldrig sjuka. Blir man sjuk med tuberkulos minskar man i vikt, får feber och när man utvecklar förändringar i lungorna tillkommer hosta, framförallt hos vuxna. Lungröntgen och bakterieprov på upphostningar används för diagnos. Tuberkulos kan också ge symtom på andra ställen i kroppen, t ex kraftigt svullna körtlar på halsen.

Hur blir man smittad?

Genom att andas in bakterier som hostats upp av en person som har en smittsam och aktiv lungtuberkulos.

Varför smittar inte barn?

Barn före puberteten smittar inte andra även om de har lunginflammationsförändringar. Det beror säkerligen på flera faktorer, som att små barn har mindre mängd bakterier. De hostar inte heller på samma sätt som vuxna.

Hur lång tid tar det att få reda på om man smittats?

Högst två månader efter att man har blivit utsatt för smitta, om man gör ett hudtest.

Hur länge smittar man ?

Om man har en smittsam form av tuberkulos krävs minst två veckors behandling innan man inte längre kan smitta andra.

Kan saker smitta, alltså leksaker, en halsduk t ex, eller en tröja?

Nej

Kan luften vara smittad, så att vissa områden är farliga att vistas i?

Det måste finnas droppar med bakterier i luften som kommer från en smittsam person som nyligen har hostat.

Hur länge är man sjuk?

Behandlingen för en person som är sjuk i tuberkulos är vanligen sex månader, men man känner sig oftast återställd långt tidigare. Har man fått sin diagnos tidigt i förloppet kan man återgå i arbete redan efter några veckor.

Ger vaccination skydd mot all tbc?

Det vaccin vi har idag ger bara ett visst skydd, framförallt mot allvarliga former av tuberkulos hos små barn. Det är ingen ovanlighet att man insjuknar med tuberkulos trots att man är vaccinerad.

Mer information

Om du har fler frågor om sjukdomen tuberkulos - TBC, kontakta smittskyddsenheten

E-post: info@smittsskyddsenheten.nu

Läs mer på smittskyddsenhetens webbplats: www.smittskyddsenheten.nu

