

STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli	
Ink.	2007 -09- 0 5
Dnr:	303 - 3368 / 2007
Fäll:	R III

Kommunstyrelsen  
2007-09-05

### Skrivelse om handlingsplan för att minska bullret i Stockholm

För höga bullernivåer kan leda till sömnstörningar, hörselskador, medföra koncentrationssvårigheter och nedsatt prestationsförmåga. Forskare har påvisat att buller över 65 dBA kan leda till stressreaktioner, och öka risken för högt blodtryck, kärlkramp och hjärtinfarkt. Barn är särskilt utsatta. Miljön både ute och inne har stor betydelse för barns utveckling och lärande.

Trafikbuller är den miljöstörning som direkt berör flest människor. De riktlinjer som Boverket har tagit fram syftar till att skapa en god boendemiljö så att människor inte utsätts för hälsofara. Miljöförvaltningens bullerkartläggning visar att längst många av de mest trafikerade gatorna överstiger bullervärdena hälsosamma nivåer.

Buller är lika skadligt för människor som bor i Stockholm som i övriga delar av landet. Istället för att ignorera de hälsorisker som bullret medför måste Stockholm aktivt arbeta för att minska bullret. Fokus ska vara att minska störningen vid källan. Den viktigaste åtgärden är att minska trafiken. Det kan i vissa fall också handla om bullerdämpande underlag, bullerskydd mm.

Miljöpartiet föreslår att staden tar fram en handlingsplan för att minska bullret i Stockholm

  
Emilia Hagberg (mp)