

Sjukhem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
I. ALLMÄNNA UPPGIFTER												
Antal boende	165		94		31		165		157		612	
Inskrivna i hemsjukvården	165	100,0%	94	100,0%	31	100,0%	165	100,0%	157	100,0%	612	100,0%
Ålder och kön												
Kvinnor	116	70,3%	62	66,0%	22	71,0%	130	78,8%	120	76,4%	450	73,5%
Män	49	29,7%	32	34,0%	9	29,0%	35	21,2%	37	23,6%	162	26,5%
Kvinnor	116	70,3%	62	66,0%	22	71,0%	130	78,8%	120	76,4%	450	73,5%
Äldst	103 år		101 år		98 år		104 år		104 år		104 år	
Yngst	66 år		66 år		68 år		70 år		73 år		66 år	
Män	49	29,7%	32	34,0%	9	29,0%	35	21,2%	37	23,6%	162	26,5%
Äldst	94 år		97 år		97 år		94 år		95 år		97 år	
Yngst	68 år		69 år		70 år		67 år		71 år		67 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Delvis		Ja		Ja		10 av 16 ja		Nej		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	165	100,0%	92	97,9%	31	100,0%	160	97,0%	148	94,3%	596	97,4%
Dosett	160	97,0%	90	95,7%	28	90,3%	161	97,6%	152	96,8%	591	96,6%
Apodos	0	0,0%	2	2,1%	2	6,5%	0	0,0%	1	0,6%	5	0,8%
Dosett + apodos	1	0,6%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
Ordination 5 eller fler läkemedel	103	62,4%	61	64,9%	16	51,6%	99	60,0%	81	51,6%	360	58,8%
Insulinbehandlad Diabetes	12	7,3%	5	5,3%	2	6,5%	13	7,9%	8	5,1%	40	6,5%
Tablettbehandlad Diabetes	0	0,0%	4	4,3%	1	3,2%	5	3,0%	8	5,1%	18	2,9%
Analgetica (N02 A) starkt smärtstillande	19	11,5%	13	13,8%	5	16,1%	23	13,9%	24	15,3%	84	13,7%
Analgetica, (N02B) lätta smärtstillande och febernedsättande	50	30,3%	27	28,7%	11	35,5%	40	24,2%	40	25,5%	168	27,5%
Neuroleptika (N05A)	30	18,2%	18	19,1%	1	3,2%	27	16,4%	36	22,9%	112	18,3%
Lugnande läkemedel (N05B)	43	26,1%	19	20,2%	9	29,0%	25	15,2%	35	22,3%	131	21,4%
varav Bensodiazepinder (N05B)	37	86,0%	16	84,2%	9	100,0%	14	56,0%	27	77,1%	103	78,6%
Sömnmedel och lugnande (N05C)	57	34,5%	29	30,9%	5	16,1%	46	27,9%	24	15,3%	161	26,3%
varav Bensodiazepinder (N05C)	36	63,2%	14	48,3%	2	40,0%	18	39,1%	12	50,0%	82	50,9%
Antidepressiva (N06A)	45	27,3%	30	31,9%	3	9,7%	38	23,0%	50	31,8%	166	27,1%
Bulkmedel (A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (A06 AD)	95	57,6%	64	68,1%	12	38,7%	118	71,5%	92	58,6%	381	62,3%
Övriga laxantia (A06)	14	8,5%	9	9,6%	0	0,0%	8	4,8%	25	15,9%	56	9,2%
Antibiotikabehandling	7	4,2%	9	9,6%	1	3,2%	11	6,7%	7	4,5%	35	5,7%
Syrgasbehandling	2	1,2%	1	1,1%	0	0,0%	3	1,8%	1	0,6%	7	1,1%
Läkemedel ordinerat vid behov	153	92,7%	72	76,6%	22	71,0%	111	67,3%	146	93,0%	504	82,4%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	4	2,4%	6	6,4%	2	6,5%	4	2,4%	4	2,5%	20	3,3%
Pågående infusionsbehandling	1	0,6%	0	0,0%	1	3,2%	2	1,2%	1	0,6%	5	0,8%
Port á cath	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	2	1,2%	1	0,6%	4	0,7%

Inflyttade med port á cath eller perifer venkanyl de senaste 3 mån.	1	0,6%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	3	0,5%
---------------------------------------------------------------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Sjukhem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja/nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja/nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	56	33,9%	17	18,1%	3	9,7%	63	38,2%	46	29,3%	185	30,2%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	43	76,8%	17	100,0%	3	100,0%	44	69,8%	9	19,6%	116	62,7%
Tillsyn / påputtning	72	43,6%	25	26,6%	5	16,1%	59	35,8%	84	53,5%	245	40,0%
Hjälp med matning	36	21,8%	25	26,6%	4	12,9%	50	30,3%	59	37,6%	174	28,4%
Sondmatning	3	1,8%	5	5,3%	0	0,0%	2	1,2%	2	1,3%	12	2,0%
Inflyttad med Peg-sond de senaste 3 månaderna	3	1,8%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	6	1,0%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	131	79,4%	94	100,0%	31	100,0%	146	88,5%	142	90,4%	544	88,9%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	133	80,6%	94	100,0%	31	100,0%	151	91,5%	154	98,1%	563	92,0%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	142	86,1%	29	30,9%	31	100,0%	139	84,2%	92	58,6%	433	70,8%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	47	33,1%	18	62,1%	5	16,1%	62	44,6%	25	27,2%	157	36,3%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	46	97,9%	18	100,0%	5	100,0%	62	100,0%	14	56,0%	145	92,4%
Bensår	3	1,8%	0	0,0%	2	6,5%	2	1,2%	1	0,6%	8	1,3%
Trycksår	5	3,0%	4	4,3%	1	3,2%	10	6,1%	4	2,5%	24	3,9%
Övriga sår	4	2,4%	2	2,1%	2	6,5%	9	5,5%	9	5,7%	26	4,2%
Eksem	6	3,6%	2	2,1%	1	3,2%	7	4,2%	9	5,7%	25	4,1%
Inflyttade med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	3	1,8%	3	3,2%	3	9,7%	3	1,8%	6	3,8%	18	2,9%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	132	80,0%	83	88,3%	20	64,5%	130	78,8%	136	86,6%	501	81,9%
Urininkontinenta	34	20,6%	5	5,3%	4	12,9%	33	20,0%	33	21,0%	109	17,8%
Urin o faecesinkontinenta	107	64,8%	74	78,7%	15	48,4%	95	57,6%	121	77,1%	412	67,3%
Sammantaget inkontinenta	141	85,5%	79	84,0%	19	61,3%	128	77,6%	154	98,1%	521	85,1%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	130	92,2%	79	100,0%	19	100,0%	123	96,1%	121	78,6%	472	90,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	62	47,7%	79	100,0%	19	100,0%	97	78,9%	121	100,0%	378	80,1%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	19	11,5%	8	8,5%	4	12,9%	10	6,1%	14	8,9%	55	9,0%
Boende med urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med colostomi	2	1,2%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,6%	1	0,6%	5	0,8%
Inflyttade med kateter, urostomi eller colostomi de senaste 3 månaderna	8	4,8%	3	3,2%	2	6,5%	2	1,2%	2	1,3%	17	2,8%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	3	1,8%	2	2,1%	0	0,0%	8	4,8%	1	0,6%	14	2,3%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	3	1,8%	6	6,4%	1	3,2%	5	3,0%	5	3,2%	20	3,3%
Pneumoni	2	1,2%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,6%	2	1,3%	6	1,0%
Infektion i kroniskt sår	2	1,2%	3	3,2%	0	0,0%	3	1,8%	2	1,3%	10	1,6%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
MRSA-odling utförd de senaste 3 månaderna	17	10,3%	9	9,6%	7	22,6%	15	9,1%	70	44,6%	118	19,3%

Sjukhem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja/nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	127	77,0%	38	40,4%	31	100,0%	72	43,6%	123	78,3%	391	63,9%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	127	100,0%	38	100,0%	31	100,0%	72	100,0%	94	76,4%	362	92,6%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	120	72,7%	78	83,0%	21	67,7%	103	62,4%	96	61,1%	418	68,3%
Boende i behov av lift	69	41,8%	49	52,1%	12	38,7%	71	43,0%	66	42,0%	267	43,6%
varav individuellt utprovat lyftskynke	69	100,0%	41	83,7%	12	100,0%	71	100,0%	65	98,5%	258	96,6%
Ordinerats sänggrindar	133	80,6%	78	83,0%	25	80,6%	112	67,9%	91	58,0%	439	71,7%
varav dokumenterat i journal	133	100,0%	72	92,3%	25	100,0%	97	86,6%	84	92,3%	411	93,6%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	45	27,3%	25	26,6%	5	16,1%	36	21,8%	58	36,9%	169	27,6%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	1	0,6%	0	0,0%	2	6,5%	1	0,6%	3	1,9%	7	1,1%
9. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterapeut	115	69,7%	20	21,3%	8	25,8%	46	27,9%	105	66,9%	294	48,0%
Del av aktuellt (=högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterap.	67	40,6%	13	13,8%	0	0,0%	59	35,8%	8	5,1%	147	24,0%
Hjälp med uppstigning och sänggående	146	88,5%	87	92,6%	28	90,3%	141	85,5%	144	91,7%	546	89,2%
Hjälp m av-och påklädning	155	93,9%	90	95,7%	28	90,3%	140	84,8%	143	91,1%	556	90,8%
Hjälp av minst 2 personer	72	43,6%	56	59,6%	15	48,4%	80	48,5%	87	55,4%	310	50,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	43	26,1%	27	28,7%	4	12,9%	22	13,3%	38	24,2%	134	21,9%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Inflyttade med trakeostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligt bedömd av läkare under mätveckan	24	14,5%	17	18,1%	7	22,6%	19	11,5%	34	21,7%	101	16,5%
Vårdtagarens hälsotillstånd diskuterats på sittrond	74	44,8%	19	20,2%	10	32,3%	57	34,5%	68	43,3%	228	37,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 månaderna	8		17		4		7		11		47	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	6	75,0%	3	17,6%	4	100,0%	7	100,0%	4	36,4%	24	51,1%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	0		0		0		2		0		2	
Boende i terminalt stadium	2	1,2%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,6%	1	0,6%	5	0,8%
Avlidna senaste 3 mån.	16	9,7%	12	12,8%	3	9,7%	20	12,1%	10	6,4%	61	10,0%

Ålderdomshem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal		Antal	%	Antal	%	Antal	%
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER												
Antal boende	84		32		saknar å-hem		18		saknar å-hem		134	
Inskrivna i hemsjukvården	84	100,0%	32	100,0%			18	100,0%			134	100,0%
Ålder och kön												
Kvinnor	64	76,2%	27	84,4%			12	66,7%			103	76,9%
Män	20	23,8%	5	15,6%			6	33,3%			31	23,1%
Kvinnor	64	76,2%	27	84,4%			12	66,7%			103	76,9%
Äldst	101 år		97 år				98 år				101 år	
Yngst	74 år		76 år				80 år				74 år	
Män	20	23,8%	5	15,6%			6	33,3%			31	23,1%
Äldst	92 år		90 år				92 år				92 år	
Yngst	70 år		76 år				75 år				70 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Nej		Ja				Ja				Nej/Ja	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	79	94,0%	32	100,0%			17	94,4%			128	95,5%
Dosett	4	4,8%	3	9,4%			18	100,0%			25	18,7%
Apodos	51	60,7%	18	56,3%			0	0,0%			69	51,5%
Dosett + apodos	27	32,1%	11	34,4%			0	0,0%			38	28,4%
Ordination 5 eller fler läkemedel	76	90,5%	25	78,1%			16	88,9%			117	87,3%
Insulinbehandlad Diabetes	10	11,9%	3	9,4%			1	5,6%			14	10,4%
Tablettbehandlad Diabetes	3	3,6%	1	3,1%			3	16,7%			7	5,2%
Analgetica (N02 A) starkt smärtstillande	9	10,7%	11	34,4%			1	5,6%			21	15,7%
Analgetica, (N02B) lätta smärtstillande och febernedsättande	15	17,9%	20	62,5%			7	38,9%			42	31,3%
Neuroleptika (N05A)	9	10,7%	8	25,0%			5	27,8%			22	16,4%
Lugnande läkemedel (N05B)	25	29,8%	10	31,3%			9	50,0%			44	32,8%
varav Bensodiazepinder (N05B)	12	48,0%	1	10,0%			9	100,0%			22	50,0%
Sömnmedel och lugnande (N05C)	37	44,0%	8	25,0%			10	55,6%			55	41,0%
varav Bensodiazepinder (N05C)	4	10,8%	3	37,5%			5	50,0%			12	21,8%
Antidepressiva (N06A)	33	39,3%	17	53,1%			6	33,3%			56	41,8%
Bulkmedel (A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (A06 AD)	27	32,1%	23	71,9%			13	72,2%			63	47,0%
Övriga laxantia (A06)	13	15,5%	5	15,6%			0	0,0%			18	13,4%
Antibiotikabehandling	6	7,1%	1	3,1%			0	0,0%			7	5,2%
Syrgasbehandling	0	0,0%	1	3,1%			0	0,0%			1	0,7%
Läkemedel ordinerat vid behov	62	73,8%	21	65,6%			18	100,0%			101	75,4%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	3	3,6%	1	3,1%			1	5,6%			5	3,7%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%

Inflyttade med port á cath eller perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
------------------------------------------------------------------	---	------	---	------	--	--	---	------	--	--	---	------

Ålderdomshem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja				Ja				Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja				Ja				Ja	
	Antal	%	Antal	%			Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	18	21,4%	18	56,3%			3	16,7%			39	29,1%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	16	88,9%	18	100,0%			3	100,0%			37	94,9%
Tillsyn / påputtning	41	48,8%	4	12,5%			5	27,8%			50	37,3%
Hjälp med matning	5	6,0%	6	18,8%			1	5,6%			12	9,0%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Inflyttad med Peg-sond de senaste 3 månaderna	1	1,2%	0	0,0%			0	0,0%			1	0,7%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	79	94,0%	32	100,0%			12	66,7%			123	91,8%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	5	6,0%	32	100,0%			18	100,0%			55	41,0%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	60	71,4%	32	100,0%			9	50,0%			101	75,4%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	13	21,7%	15	46,9%			0	0,0%			28	27,7%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	5	38,5%	15	100,0%			0	0,0%			20	71,4%
Bensår	4	4,8%	1	3,1%			0	0,0%			5	3,7%
Trycksår	1	1,2%	4	12,5%			0	0,0%			5	3,7%
Övriga sår	0	0,0%	5	15,6%			1	5,6%			6	4,5%
Eksem	2	2,4%	1	3,1%			1	5,6%			4	3,0%
Inflyttade med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	51	60,7%	24	75,0%			13	72,2%			88	65,7%
Urininkontinenta	42	50,0%	15	46,9%			14	77,8%			71	53,0%
Urin o faecesinkontinenta	36	42,9%	17	53,1%			1	5,6%			54	40,3%
Sammantaget inkontinenta	78	92,9%	32	100,0%			15	83,3%			125	93,3%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälmedel	71	91,0%	28	87,5%			15	100,0%			114	91,2%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	32	45,1%	28	100,0%			10	66,7%			70	61,4%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	2	2,4%	0	0,0%			2	11,1%			4	3,0%
Boende med urostomi	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Boende med colostomi	2	2,4%	1	3,1%			0	0,0%			3	2,2%
Inflyttade med kateter, urostomi eller colostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	1	1,2%	1	3,1%			1	5,6%			3	2,2%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	5	6,0%	0	0,0%			0	0,0%			5	3,7%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	1	1,2%	1	3,1%			0	0,0%			2	1,5%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
MRSA-odling utförd de senaste 3 månaderna	1	1,2%	0	0,0%			1	5,6%			2	1,5%

Ålderdomshem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja				Ja				Ja	
	Antal	%	Antal	%			Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramed.	59	70,2%	32	100,0%			2	11,1%			93	69,4%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	59	100,0%	32	100,0%			2	100,0%			93	100,0%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	24	28,6%	22	68,8%			7	38,9%			53	39,6%
Boende i behov av lift	9	10,7%	7	21,9%			2	11,1%			18	13,4%
varav individuellt utprovat lyftskynke	9	100,0%	7	100,0%			2	100,0%			18	100,0%
Ordinerats sänggrindar	21	25,0%	16	50,0%			3	16,7%			40	29,9%
varav dokumenterat i journal	21	100,0%	16	100,0%			3	100,0%			40	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	1	1,2%	9	28,1%			1	5,6%			11	8,2%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	1	1,2%	0	0,0%			0	0,0%			1	0,7%
9. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterapeut	7	8,3%	0	0,0%			4	22,2%			11	8,2%
Del av aktuellt (=6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterapeut	18	21,4%	0	0,0%			0	0,0%			18	13,4%
Hjälp med uppstigning och sänggående	51	60,7%	25	78,1%			12	66,7%			88	65,7%
Hjälp m av-och påklädning	58	69,0%	29	90,6%			16	88,9%			103	76,9%
Hjälp av minst 2 personer	18	21,4%	10	31,3%			4	22,2%			32	23,9%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	2	2,4%	3	9,4%			0	0,0%			5	3,7%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Inflyttade med trakeostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%			0	0,0%			0	0,0%
Personligt bedömd av läkare under mätveckan	14	16,7%	3	9,4%			2	11,1%			19	14,2%
Vårdtagarens hälsotillstånd diskuterats på sittrond	32	38,1%	11	34,4%			9	50,0%			52	38,8%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 månaderna	10		2				2				14	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	6	60,0%	1	50,0%			2	100,0%			9	68,2%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	0		0				0				0	
Boende i terminalt stadium	0	0,0%	0	0,0%			1	5,6%			1	0,7%
Avlidna senaste 3 mån.	4	4,8%	3	9,4%			1	5,6%			8	6,0%

Inflyttade med port á cath eller perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
---------------------------------------------------------------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Gruppboende i samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	35	26,7%	24	28,2%	6	19,4%	11	28,2%	2	25,0%	78	26,5%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	27	77,1%	24	100,0%	5	83,3%	11	100,0%	2	100,0%	69	88,5%
Tillsyn / påputtning	77	58,8%	25	29,4%	12	38,7%	15	38,5%	4	50,0%	133	45,2%
Hjälp med matning	32	24,4%	7	8,2%	10	32,3%	12	30,8%	1	12,5%	62	21,1%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Inflyttad med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	123	93,9%	83	97,6%	31	100,0%	39	100,0%	5	62,5%	281	95,6%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	127	96,9%	83	97,6%	31	100,0%	38	97,4%	8	100,0%	287	97,6%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	123	93,9%	39	45,9%	2	6,5%	30	76,9%	6	75,0%	200	68,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	44	35,8%	15	38,5%	2	100,0%	12	40,0%	2	33,3%	75	37,5%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	30	68,2%	11	73,3%	2	100,0%	12	100,0%	2	100,0%	57	76,0%
Bensår	0	0,0%	2	2,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%
Trycksår	0	0,0%	2	2,4%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,0%
Övriga sår	2	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	5,1%	1	12,5%	5	1,7%
Eksem	0	0,0%	1	1,2%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,0%
Inflyttade med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	85	64,9%	53	62,4%	30	96,8%	26	66,7%	8	100,0%	202	68,7%
Urininkontinenta	46	35,1%	26	30,6%	19	61,3%	9	23,1%	3	37,5%	103	35,0%
Urin o faecesinkontinenta	45	34,4%	36	42,4%	12	38,7%	19	48,7%	5	62,5%	117	39,8%
Sammantaget inkontinenta	91	69,5%	62	72,9%	31	100,0%	28	71,8%	8	100,0%	220	74,8%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälmedel	91	100,0%	62	100,0%	31	100,0%	28	100,0%	8	100,0%	220	100,0%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	91	100,0%	46	74,2%	31	100,0%	22	78,6%	8	100,0%	198	90,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	4	3,1%	1	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	1,7%
Boende med urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med colostomi	1	0,8%	1	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%
Inflyttade med kateter, urostomi eller colostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	2	1,5%	4	4,7%	4	12,9%	1	2,6%	0	0,0%	11	3,7%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	4	3,1%	4	4,7%	1	3,2%	1	2,6%	0	0,0%	10	3,4%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	1	0,3%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	1	12,5%	2	0,7%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd de senaste 3 månaderna	2	1,5%	3	3,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	1,7%

Gruppboende i samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	124	94,7%	38	44,7%	31	100,0%	12	30,8%	6	75,0%	211	71,8%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	103	83,1%	36	94,7%	31	100,0%	12	100,0%	6	100,0%	188	89,1%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	31	23,7%	18	21,2%	9	29,0%	11	28,2%	3	37,5%	72	24,5%
Boende i behov av lift	22	16,8%	11	12,9%	4	12,9%	9	23,1%	1	12,5%	47	16,0%
varav individuellt utprovat lyftskynke	22	100,0%	11	100,0%	4	100,0%	9	100,0%	1	100,0%	47	100,0%
Ordinerats sänggrindar	32	24,4%	30	35,3%	11	35,5%	12	30,8%	3	37,5%	88	29,9%
varav dokumenterat i journal	32	100,0%	30	100,0%	11	100,0%	12	100,0%	3	100,0%	88	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	8	6,1%	14	16,5%	1	3,2%	3	7,7%	2	25,0%	28	9,5%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	3	2,3%	4	4,7%	1	3,2%	1	2,6%	0	0,0%	9	3,1%
9. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterapeut	30	22,9%	16	18,8%	1	3,2%	2	5,1%	7	87,5%	56	19,0%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arb.terapeut	29	22,1%	15	17,6%	0	0,0%	5	12,8%	0	0,0%	49	16,7%
Hjälp med uppstigning och sänggående	90	68,7%	62	72,9%	19	61,3%	20	51,3%	4	50,0%	195	66,3%
Hjälp m av-och påklädning	99	75,6%	73	85,9%	19	61,3%	29	74,4%	8	100,0%	228	77,6%
Hjälp av minst 2 personer	35	26,7%	23	27,1%	11	35,5%	13	33,3%	3	37,5%	85	28,9%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	16	12,2%	4	4,7%	3	9,7%	3	7,7%	2	25,0%	28	9,5%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Inflyttade med trakeostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligt bedömd av läkare under mätveckan	6	4,6%	13	15,3%	4	12,9%	4	10,3%	0	0,0%	27	9,2%
Vårdtagarens hälsotillstånd diskuterats på sittrond	36	27,5%	25	29,4%	5	16,1%	9	23,1%	0	0,0%	75	25,5%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 månaderna	14		12		0		2		2		30	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	6	42,9%	9	75,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	16	71,0%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	1		2		0		0		0		3	
Boende i terminalt stadium	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidna senaste 3 mån.	6	4,6%	8	9,4%	1	3,2%	1	2,6%	0	0,0%	16	5,4%

Inflyttade med port á cath eller perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
------------------------------------------------------------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Servicehus samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja/Nej		Ja		Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	10	8,8%	5	1,9%	13	7,8%	5	5,4%	7	5,7%	40	5,3%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	2	20,0%	5	100,0%	9	69,2%	3	60,0%	5	71,4%	24	60,0%
Tillsyn / påputtning	8	7,1%	28	10,8%	33	19,8%	6	6,5%	10	8,1%	85	11,3%
Hjälp med matning	3	2,7%	9	3,5%	8	4,8%	4	4,3%	12	9,8%	36	4,8%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	2	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
Inflyttad med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	10	8,8%	45	17,4%	65	38,9%	69	74,2%	31	25,2%	220	29,1%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	0	0,0%	49	18,9%	54	32,3%	20	21,5%	70	56,9%	193	25,6%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	3	2,7%	2	0,8%	60	35,9%	0	0,0%	27	22,0%	92	12,2%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	3	100,0%	2	100,0%	5	8,3%	0	0,0%	12	44,4%	22	23,9%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	3	100,0%	2	100,0%	5	100,0%	0	0,0%	9	75,0%	19	86,4%
Bensår	11	9,7%	12	4,6%	2	1,2%	4	4,3%	9	7,3%	38	5,0%
Trycksår	4	3,5%	2	0,8%	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	7	0,9%
Övriga sår	5	4,4%	5	1,9%	7	4,2%	3	3,2%	4	3,3%	24	3,2%
Eksem	5	4,4%	5	1,9%	7	4,2%	0	0,0%	1	0,8%	18	2,4%
Inflyttade med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	2	1,8%	4	1,5%	0	0,0%	1	1,1%	2	1,6%	9	1,2%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	20	17,7%	67	25,9%	51	30,5%	29	31,2%	64	52,0%	231	30,6%
Urininkontinenta	54	47,8%	45	17,4%	97	58,1%	37	39,8%	36	29,3%	269	35,6%
Urin o faecesinkontinenta	9	8,0%	44	17,0%	9	5,4%	17	18,3%	22	17,9%	101	13,4%
Sammantaget inkontinenta	63	55,8%	89	34,4%	106	63,5%	54	58,1%	58	47,2%	370	49,0%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	54	85,7%	89	100,0%	105	99,1%	51	94,4%	42	72,4%	341	92,2%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	54	100,0%	52	58,4%	105	100,0%	51	100,0%	30	71,4%	292	85,6%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	5	4,4%	14	5,4%	10	6,0%	2	2,2%	5	4,1%	36	4,8%
Boende med urostomi	0	0,0%	1	0,4%	2	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,4%
Boende med colostomi	1	0,9%	2	0,8%	3	1,8%	0	0,0%	2	1,6%	8	1,1%
Inflyttade med kateter, urostomi eller colostomi de senaste 3 månaderna	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%	1	0,8%	3	0,4%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	4	3,5%	5	1,9%	2	1,2%	1	1,1%	3	2,4%	15	2,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	5	4,4%	9	3,5%	4	2,4%	6	6,5%	3	2,4%	27	3,6%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	1	1,1%	0	0,0%	2	0,3%
Infektion i kroniskt sår	8	7,1%	3	1,2%	2	1,2%	2	2,2%	2	1,6%	17	2,3%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	2	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
MRSA-odling utförd de senaste 3 månaderna	3	2,7%	3	1,2%	2	1,2%	2	2,2%	2	1,6%	12	1,6%

Servicehus samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Nej/Ja		Ja		Ja		Ja		Nej/Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	8	7,1%	18	6,9%	139	83,2%	19	20,4%	25	20,3%	209	27,7%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	8	100,0%	18	100,0%	139	100,0%	19	100,0%	25	100,0%	209	100,0%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	34	30,1%	75	29,0%	54	32,3%	29	31,2%	63	51,2%	255	33,8%
Boende i behov av lift	4	3,5%	8	3,1%	8	4,8%	5	5,4%	9	7,3%	34	4,5%
varav individuellt utprovat lyftskynke	2	50,0%	8	100,0%	8	100,0%	5	100,0%	9	100,0%	32	94,1%
Ordinerats sänggrindar	4	3,5%	15	5,8%	14	8,4%	5	5,4%	17	13,8%	55	7,3%
varav dokumenterat i journal	4	100,0%	4	26,7%	3	21,4%	5	100,0%	15	88,2%	31	56,4%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	5	4,4%	2	0,8%	7	4,2%	0	0,0%	2	1,6%	16	2,1%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	1	0,9%	6	2,3%	3	1,8%	3	3,2%	6	4,9%	19	2,5%
9. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterapeut	0	0,0%	13	5,0%	12	7,2%	7	7,5%	54	43,9%	86	11,4%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterapeut	2	1,8%	38	14,7%	15	9,0%	21	22,6%	52	42,3%	128	17,0%
Hjälp med uppstigning och sänggående	26	23,0%	66	25,5%	78	46,7%	30	32,3%	72	58,5%	272	36,0%
Hjälp m av-och påklädning	31	27,4%	88	34,0%	90	53,9%	37	39,8%	85	69,1%	331	43,8%
Hjälp av minst 2 personer	8	7,1%	23	8,9%	21	12,6%	14	15,1%	26	21,1%	92	12,2%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	4	3,5%	4	1,5%	5	3,0%	5	5,4%	5	4,1%	23	3,0%
Trakeostomi	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	2	2,2%	1	0,8%	4	0,5%
Inflyttade med trakeostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligt bedömd av läkare under mätveckan	8	7,1%	18	6,9%	15	9,0%	14	15,1%	9	7,3%	64	8,5%
Vårdtagarens hälsotillstånd diskuterats på sittrond	15	13,3%	31	12,0%	31	18,6%	16	17,2%	7	5,7%	100	13,2%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 månaderna	5		30		25		15		16		91	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	4	80,0%	27	90,0%	23	92,0%	9	60,0%	11	68,8%	74	81,3%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de sen 3 mån	2		3		1		2		0		8	
Boende i terminalt stadium	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,1%
Avlidna senaste 3 mån.	0	0,0%	11	4,2%	9	5,4%	4	4,3%	5	4,1%	29	3,8%

Totalt särskilda boendeformer, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER												
Antal boende	551		538		283		340		352		2064	
Inskrivna i hemsjukvården	493	89,5%	470	87,4%	229	80,9%	315	92,6%	288	81,8%	1795	87,0%
Ålder och kön												
Kvinnor	353	71,6%	326	69,4%	166	72,5%	242	76,8%	217	75,3%	1304	72,6%
Män	140	28,4%	144	30,6%	63	27,5%	73	23,2%	71	24,7%	491	27,4%
Kvinnor	353	71,6%	326	69,4%	166	72,5%	242	76,8%	217	75,3%	1304	72,6%
Äldst	103 år		100 år		100 år		104 år		104 år		104 år	
Yngst	40 år		61 år		41 år		69 år		54 år		40 år	
Män	140	28,4%	144	30,6%	63	27,5%	73	23,2%	71	24,7%	491	27,4%
Äldst	97 år		97 år		99 år		101 år		97 år		101 år	
Yngst	59 år		50 år		59 år		63 år		60 år		50 år	
Antal boende under 65 år	5	1,0%	11	2,3%	4	1,7%	1	0,3%	3	1,0%	24	1,3%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Nej		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	437	88,6%	350	74,5%	181	79,0%	281	89,2%	256	88,9%	1505	83,8%
Dosett	251	50,9%	206	43,8%	100	43,7%	247	78,4%	249	86,5%	1053	58,7%
Apodos	178	36,1%	182	38,7%	88	38,4%	49	15,6%	18	6,3%	515	28,7%
Dosett + apodos	60	12,2%	46	9,8%	31	13,5%	7	2,2%	16	5,6%	160	8,9%
Ordination 5 eller fler läkemedel	341	69,2%	281	59,8%	155	67,7%	188	59,7%	161	55,9%	1126	62,7%
Insulinbehandlad Diabetes	40	8,1%	34	7,2%	17	7,4%	27	8,6%	15	5,2%	133	7,4%
Tablettbehandlad Diabetes	18	3,7%	25	5,3%	13	5,7%	23	7,3%	17	5,9%	96	5,3%
Analgetica (N02 A) starkt smärtstillande	69	14,0%	76	16,2%	55	24,0%	50	15,9%	45	15,6%	295	16,4%
Analgetica (N02B) lätta smärtstillande och febernedsättande	136	27,6%	155	33,0%	82	35,8%	94	29,8%	86	29,9%	553	30,8%
Neuroleptika (N05A)	85	17,2%	69	14,7%	38	16,6%	55	17,5%	50	17,4%	297	16,5%
Lugnande läkemedel (N05B)	126	25,6%	92	19,6%	43	18,8%	69	21,9%	53	18,4%	383	21,3%
varav Bensodiazepinder (N05B)	96	76,2%	64	69,6%	36	83,7%	47	68,1%	39	73,6%	282	73,6%
Sömnmedel och lugnande (N05C)	201	40,8%	134	28,5%	79	34,5%	107	34,0%	71	24,7%	592	33,0%
varav Bensodiazepinder (N05C)	63	31,3%	43	32,1%	11	13,9%	34	31,8%	43	60,6%	194	32,8%
Antidepressiva (N06A)	143	29,0%	136	28,9%	85	37,1%	71	22,5%	94	32,6%	529	29,5%
Bulkmedel (A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (A06 AD)	216	43,8%	211	44,9%	106	46,3%	185	58,7%	139	48,3%	857	47,7%
Övriga laxantia (A06)	35	7,1%	40	8,5%	15	6,6%	20	6,3%	25	8,7%	135	7,5%
Antibiotikabehandling	26	5,3%	23	4,9%	9	3,9%	20	6,3%	9	3,1%	87	4,8%
Syrgasbehandling	4	0,8%	2	0,4%	0	0,0%	3	1,0%	2	0,7%	11	0,6%
Läkemedel ordinerat vid behov	378	76,7%	228	48,5%	130	56,8%	201	63,8%	194	67,4%	1131	63,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	27	5,5%	29	6,2%	15	6,6%	5	1,6%	23	8,0%	99	5,5%
Pågående infusionsbehandling	1	0,2%	0	0,0%	1	0,4%	2	0,6%	1	0,3%	5	0,3%
Port á cath	1	0,2%	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	1	0,3%	3	0,2%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	2	0,6%	1	0,3%	4	0,2%

Totalt särskilda boendeformer, samtliga fem stadsdelar

Inflyttade med port á cath eller perifer venkanyl de senaste 3 mån.	1	0,2%	1	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	3	0,2%
---------------------------------------------------------------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	119	24,1%	64	13,6%	22	9,6%	82	26,0%	55	19,1%	342	19,1%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	88	73,9%	64	100,0%	17	77,3%	61	74,4%	16	29,1%	246	71,9%
Tillsyn / påputtning	198	40,2%	82	17,4%	50	21,8%	85	27,0%	98	34,0%	513	28,6%
Hjälp med matning	76	15,4%	47	10,0%	22	9,6%	67	21,3%	72	25,0%	284	15,8%
Sondmatning	3	0,6%	5	1,1%	2	0,9%	2	0,6%	2	0,7%	14	0,8%
Inflyttad med Peg-sond de senaste 3 månaderna	4	0,8%	1	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%	7	0,4%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	343	69,6%	254	54,0%	127	55,5%	266	84,4%	178	61,8%	1168	65,1%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	265	53,8%	258	54,9%	116	50,7%	227	72,1%	232	80,6%	1098	61,2%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	328	66,5%	102	21,7%	93	40,6%	178	56,5%	125	43,4%	826	46,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	107	32,6%	50	49,0%	12	12,9%	74	41,6%	39	31,2%	282	34,1%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	84	78,5%	46	92,0%	12	100,0%	74	100,0%	25	64,1%	241	85,5%
Bensår	18	3,7%	15	3,2%	4	1,7%	6	1,9%	10	3,5%	53	3,0%
Trycksår	10	2,0%	12	2,6%	2	0,9%	11	3,5%	4	1,4%	39	2,2%
Övriga sår	11	2,2%	12	2,6%	9	3,9%	15	4,8%	14	4,9%	61	3,4%
Eksem	13	2,6%	9	1,9%	10	4,4%	8	2,5%	10	3,5%	50	2,8%
Inflyttade med sår/eksem de senaste 3 månaderna	5	1,0%	8	1,7%	3	1,3%	4	1,3%	8	2,8%	28	1,6%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	288	58,4%	227	48,3%	101	44,1%	198	62,9%	208	72,2%	1022	56,9%
Urininkontinenta	176	35,7%	91	19,4%	120	52,4%	98	31,1%	72	25,0%	557	31,0%
Urin o faecesinkontinenta	197	40,0%	171	36,4%	36	15,7%	132	41,9%	148	51,4%	684	38,1%
Sammantaget inkontinenta	373	75,7%	262	55,7%	156	68,1%	230	73,0%	220	76,4%	1241	69,1%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	357	95,7%	258	98,5%	155	99,4%	217	94,3%	171	77,7%	1158	93,3%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	250	70,0%	205	79,5%	155	100,0%	180	82,9%	159	93,0%	949	82,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	30	6,1%	23	4,9%	14	6,1%	14	4,4%	19	6,6%	100	5,6%
Boende med urostomi	0	0,0%	1	0,2%	2	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,2%
Boende med colostomi	6	1,2%	5	1,1%	3	1,3%	1	0,3%	3	1,0%	18	1,0%
Inflyttade med kateter, urostomi eller colostomi de senaste 3 mån.	11	2,2%	3	0,6%	2	0,9%	3	1,0%	3	1,0%	22	1,2%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	10	2,0%	12	2,6%	6	2,6%	11	3,5%	4	1,4%	43	2,4%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	17	3,4%	19	4,0%	6	2,6%	12	3,8%	8	2,8%	62	3,5%
Pneumoni	2	0,4%	1	0,2%	1	0,4%	3	1,0%	2	0,7%	9	0,5%
Infektion i kroniskt sår	11	2,2%	7	1,5%	3	1,3%	5	1,6%	5	1,7%	31	1,7%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	3	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,2%
MRSA-odling utförd de senaste 3 månaderna	23	4,7%	15	3,2%	9	3,9%	18	5,7%	72	25,0%	137	7,6%

Totalt särskilda boendeformer, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	318	64,5%	126	26,8%	201	87,8%	105	33,3%	154	53,5%	904	50,4%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	297	93,4%	124	98,4%	201	100,0%	105	100,0%	125	81,2%	852	94,2%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	209	42,4%	193	41,1%	84	36,7%	150	47,6%	162	56,3%	798	44,5%
Boende i behov av lift	104	21,1%	75	16,0%	24	10,5%	87	27,6%	76	26,4%	366	20,4%
varav individuellt utprovat lyftskynke	102	98,1%	67	89,3%	24	100,0%	87	100,0%	75	98,7%	355	97,0%
Ordinerats sänggrindar	190	38,5%	139	29,6%	50	21,8%	132	41,9%	111	38,5%	622	34,7%
varav dokumenterat i journal	190	100,0%	122	87,8%	39	78,0%	117	88,6%	102	91,9%	570	91,6%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	59	12,0%	50	10,6%	13	5,7%	40	12,7%	62	21,5%	224	12,5%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	6	1,2%	10	2,1%	6	2,6%	5	1,6%	9	3,1%	36	2,0%
9. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arbetsterapeut	152	30,8%	49	10,4%	21	9,2%	59	18,7%	166	57,6%	447	24,9%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort av arb.terapeut	116	23,5%	66	14,0%	15	6,6%	85	27,0%	60	20,8%	342	19,1%
Hjälp med uppstigning och sänggående	313	63,5%	240	51,1%	125	54,6%	203	64,4%	220	76,4%	1101	61,3%
Hjälp m av-och påklädning	343	69,6%	280	59,6%	137	59,8%	222	70,5%	236	81,9%	1218	67,9%
Hjälp av minst 2 personer	133	27,0%	112	23,8%	47	20,5%	111	35,2%	116	40,3%	519	28,9%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	65	13,2%	38	8,1%	12	5,2%	30	9,5%	45	15,6%	190	10,6%
Trakeostomi	0	0,0%	1	0,2%	1	0,4%	2	0,6%	1	0,3%	5	0,3%
Inflyttade med trakeostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligt bedömd av läkare under mätveckan	52	10,5%	51	10,9%	26	11,4%	39	12,4%	43	14,9%	211	11,8%
Vårdtagarens hälsotillstånd diskuterats på sittrond	157	31,8%	86	18,3%	46	20,1%	91	28,9%	75	26,0%	455	25,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 mån	37		61		29		26		29		182	
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	22	59,5%	40	65,6%	27	93,1%	19	73,1%	15	51,7%	123	67,6%
Akut inlagd på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de sen 3 mån	3		5		1		4		0		13	0,7%
Boende i terminalt stadium	2	0,4%	1	0,2%	0	0,0%	3	1,0%	1	0,3%	7	0,4%
Avlidna senaste 3 mån.	26	5,3%	34	7,2%	13	5,7%	26	8,3%	15	5,2%	114	6,4%